Middelbeskrivelse og effekt

Middel	Dose-ring	Aktivstof	Midlernes effekt[1)]									
			Blad (0-5)	Knold (0-5)	Ny-vækst	Sten-gel	Fore-byg-gende	Ku-ra-tivt	Anti-sporu-lering	Regn-fast-hed	Blad-plet	Mobi-li-tet
Amistar Azoxystrobin	0,5 l	250 g/l	-	-	-	-	-	-	-	●(●) 1-2 t.	●●(●)	S+T
Cymbal/Option Cymoxanil	0,25/ 0,2 kg	450/600 g/kg	-	-	-	(●)	●●	●●	●	●● 1 t.	-	T+K
Narita Difenoconazol	0,4 l	250 g/l	-	-	-	-	-	-	-	- 30-60 m.	●●●	K
Proxanil (Propamocarp + cymoxanil)	2,0 l	333,6 + 50 g/l	-	-	-	-	●(●)	●●(●)	●●(●)	- 2 t.	-	S+T
Revus Mandipropamid	0,6 l	250 g/l	4,0	-	●●	●(●)	●●●	●	●(●)	●●● 15-30 m.	-	T/K
Revus Top SC (Mandipropamid + Difenoconazol)	0,6 l	250 + 250 g/l	4,0	-	●●	●(●)	●●●	●	●(●)	●●● 15-30 m.	●●●	T/K+K
Signum (Pyraclostrobin + Boscalid)	0,25 kg	67 + 267 g/kg	-	-	-	-	-	-	-	●(●) 2 t.	●●●(●)	S
Shirlan Ultra/Zignal Fluazinam	0,4 l	500 g/l	2,9	-	-	●	●●●	0	0	●●(●) 1 t.	(●)	K
Vendetta (Azoxystrobin + Fluazinam)	0,5 l	150 + 375 g/l	3,6	-	-	-	-	-	-	-	●●●	C+C
Zorvec Enicade (Oxathiapiprolin)	0,15 l	100 g/l	-	-	●●(●)	●●(●)	●●●	●●	●●(●)	●●●	-	S

*1) Karakter for effekt på bladskimmel er baseret på europæiske forsøg (inkl. Danmark) 2006-2015. Knoldskimmel baseret på vurdering fra forsøg 2009-2011. Hvor intet er anført, er der ikke udført forsøg. Vurdering af virkning er baseret på både forsøg og erfaringer. 0 ingen virkning, ● nogen virkning, ●● god virkning, ●●● meget god virkning, Blank (-) ingen vurdering. "**Blad**": Virkning mod bladskimmel på en skala fra 2 - 5, "**Knold**": Virkning mod knoldangreb på en skala fra 0-5. "**Nyvækst**" Midlets evne til at beskytte nyvækst/uudviklede blade. "**Forebyggende**": Midlets samlede fremadrettede effekt, når det er udbragt før infektion. "**Kurativ**": Vurdering af midlernes effekt, hvis der sprøjtes efter infektion (12-24 timer). "**Antisporulerende effekt**": Effekt på svampens evne til at sporulere (danne sporangier). "**Regnfasthed**": Vurdering af midlernes regnfasthed ca. en time efter sprøjtning. "**Bladplet**": Vurdering af midlernes effekt på kartoffelbladplet (Alternaria solani/alternata) 0 ingen virkning, ● nogen virkning, ●● rimelig virkning, ●●● god virkning, ●●●● meget god virkning. "**Mobilitet**": T= translaminær middel (går gennem bladet), K=kontaktmiddel (beskytter den behandlede overflade og S = systemisk middel (trænger ind og delvis rundt i bladet).*

2) Ved gentagen (ugentlig) behandling igennem hele vækstsæsonen

Kilde: Euroblight